


Migravent® von Orthoexpert®

PZN 5462886

Zur diätetischen Behandlung der Migräne.

Migravent unterstützt gezielt den Energiestoffwechsel im Gehirn. Die gezielte Kombination ausgewählter Mikronährstoffe ist auf den besonderen Bedarf von Personen mit Migräne abgestimmt.



Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Aufgrund des erhöhten Bedarfs bei Migräne sind die Vitamine, Coenzym Q 10, die Mineralstoffe und Spurenelemente erhöht.

Inhaltsstoffe

Zusammensetzung	pro 2 Kapseln	pro 4 Kapseln	pro 100 g
Vitamin A (RE*)	375 µg	750 µg	28000 µg
Vitamin C	100 mg	200 mg	7440 mg
Vitamin E (TE**)	67 mg	134 mg	5000 mg
Vitamin B1	2,5 mg	5 mg	186 mg
Vitamin B2	200 mg	400 mg	14880 mg
Vitamin B3	10 mg	20 mg	744 mg
Vitamin B6	2,5 mg	5 mg	186 mg
Vitamin B12	3 µg	6 µg	223 µg
Folsäure	200 µg	400 µg	14900 µg
Vitamin D3	2,5 µg	5 µg	186 µg
Pantothensäure	5 mg	10 mg	372 mg
Biotin	0,0825 mg	0,165 mg	6,1 mg
Coenzym Q10	75 mg	150 mg	5580 mg
Magnesium	300 mg	600 mg	22320 mg
Eisen	0,4 mg	0,8 mg	29,8 mg
Zink	2,5 mg	5 mg	186 mg
Mangan	1 mg	2 mg	74,4 mg
Kupfer	250 µg	500 µg	18600 µg
Chrom	15 µg	30 µg	1100 µg
Molybdän	30 µg	60 µg	2200 µg
Bioflavonoide	2,5 mg	5 mg	186 mg
Selen	25 µg	50 µg	1900 µg
Brennwert	3,7 kJ (0,9 kcal)	7,5 kJ (1,8 kcal)	272 kJ (64 kcal)
Eiweiß	0,2 g	0,4 g	14,5 g
Kohlenhydrate	0,02 g	0,04 g	1,5 g
davon Zucker	–	–	–
Stärke	0,02 g	0,04 g	1,5 g
Fett	–	–	–

*RE = Retinoläquivalente, **TE = Tocopheroläquivalente

Verzehrempfehlung:

2 x täglich 1-2 Kapseln morgens und abends zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.

Erhältliche Packungsgröße:

90 Kapseln UVP 25,45 €

Wichtige Hinweise:

Bei Migravent handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät. Die Anwendung sollte gemäß der Gebrauchsempfehlung täglich über einige Monate erfolgen. Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Während der Anwendung von Migravent sollten Sie keine anderen Magnesium- oder Vitamin B2-haltigen Produkte einnehmen. Schwangere und Kinder sollten die Anwendung mit Ihrem Arzt abstimmen. Vitamin B2 ruft eine unbedenkliche gelbliche Färbung des Urins hervor. Breiige Stühle und Völlegefühl können auftreten.

Wie alle Magnesium-haltigen Präparate sollte Migravent bei gestörter Nierenfunktion nicht angewendet werden. Im Hinblick auf mögliche Resorptionsbeeinträchtigungen sollte generell ein Abstand von 1 - 2 Stunden zwischen der Einnahme von Migravent und Arzneimitteln mit den folgenden Wirkstoffen eingehalten werden: Tetracycline, Eisen-haltige Verbindungen, Natriumfluorid, Isoniazid, Chlorpromazin und Digoxin. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Exklusiv in der Apotheke